

Alt Çenede İki ve Üç İmplant Üzerine Yapılan Hareketli Protezlerin Hasta Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Aysouda Azizpour¹, Taha Pergel², Emine Fulya Akkoyun²

¹Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

²Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi İstanbul, Türkiye

Giriş: Bu çalışmanın amacı, alt çenede iki ve üç implant üstü hareketli protezlerle tedavi edilen hastalarda, ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi ve genel yaşam doyumunu üzerindeki etkilerinin OHIP-14 ve yaşam doyumunu ölçerği kullanılarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: 2020-2025 yılları arasında, alt çenede implant üstü hareketli protezlerle tedavi edilen 45-80 yaş aralığındaki 60 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar telefonla aranarak bilgilendirilmiş, ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesi ve memnuniyet düzeylerini değerlendirmek amacıyla OHIP-14 ve yaşam doyum anketi kapsamındaki sorular yöneltilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya toplam 60 birey dahil edilmiş olup, OHIP-14 ölçeği ile yapılan değerlendirmede madde bazlı ortalama skorlar genel olarak düşük bulunmuş ve katılımcıların ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. En fazla sorun yemek yerken duyulan rahatsızlık ($0,50 \pm 0,79$) ve diyet kısıtlamaları ($0,54 \pm 0,67$) alanlarında görülürken; sosyal hayattan soyutlanma ve iş yapmada yetersizlik ($0,01 \pm 0,13$) en düşük şikayet skorlarını oluşturmuştur. Standart sapma değerleri, bireyler arasında kısmi farklılıklar olduğunu ancak genel dağılımın düşük skorlar etrafında toplandığını göstermektedir. Yaşam doyumuna ilişkin analizlerde (SWLS), hastaların genel yaşam doyum düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır ($2,52 \pm 0,93$).

Sonuç: Bu çalışma, alt çene tam dişsizlik durumunda uygulanan implant destekli hareketli protezlerin, hastaların genel yaşam doyumunu pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. OHIP-14 verileri incelendiğinde; hastaların en çok yemek yeme konforundaki kısıtlılıklardan, diyet seçimindeki zorluklardan müzdarip oldukları saptanmıştır. Ayrıca, bazı hastalarda gözlenen hafif düzeyde telaffuz güçlükleri ve buna bağlı gelişen geçici sosyal psikolojik gerginlikler, protez adaptasyonu sürecinde dikkat çeken diğer unsurlardır. Sonuç olarak, tedavi yaşam standartlarını yükseltse de; fonksiyonel başarının ve psikososyal güvenin maksimize edilmesi için hasta beklentilerinin doğru yönetilmesi kritik öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: Dental İmplant, Tam Dişsizlik, Hareketli Protez, OHIP-14, Mandibula, Yaşam doyumunu (SWLS)