

## Odontojenik Kist ve Tümörlerle İlişkili Dişlerde Apikal Rezeksiyon Sonrası Hasta Memnuniyetinin OHIP-14 İle Değerlendirilmesi

Selin EREN<sup>1</sup>, Taha PERGEL<sup>2</sup>, Emine Fulya AKKOYUN<sup>2</sup>, Ali COŞAR<sup>3</sup>,  
Mohamad Samer ALRAJEH<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye

<sup>2</sup>Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

<sup>3</sup>Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

**Giriş:** Bu çalışmanın amacı, odontojenik kist ve tümörlerle ilişkili dişlerde endodontik tedavi ve kök ucu rezeksiyonu uygulanmış bireylerde, tedavi sonrası hasta memnuniyeti ile ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin OHIP-14 ölçeği aracılığıyla değerlendirilmesidir.

**Gereç ve Yöntem:** 2020-2024 yılları arasında, odontojenik kist ve tümörlerle ilişkili dişlerde endodontik tedavi ve apikal rezeksiyon sonrası hastalara ait kayıtlar geriye dönük olarak incelenmiş ve kriterlere uyan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar telefonla aranıp bilgilendirilmiş ve OHIP-14 kapsamındaki sorular kendilerine yöneltilmiştir.

**Bulgular:** Çalışmaya toplam 18-60 yaş arası 48 birey dahil edilmiş ve tek grup ile çalışılmıştır. Örneklem ve değişkenler ortalama ve standart sapma ile değerlendirilmiştir. OHIP-14 ölçeğine ait madde bazlı ortalama skorlar incelendiğinde ortalamanın genel olarak 0,00 – 0,85 aralığında seyrettiği yani düşük olduğu saptanmıştır. Bu durum, katılımcıların ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin genel olarak iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Standart sapma değerleri incelendiğinde ise değişkenlik 0,00– 1,08 aralığında olup, bazı bireylerde şikayetlerin daha belirgin olabileceğini ancak genel dağılımın düşük skorlar etrafında toplandığını göstermektedir.

**Sonuç:** OHIP-14 bulguları, tedavi sonrası dönemde hastaların genel olarak ağız sağlığına bağlı yaşam kalitesinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. En belirgin etkinin fiziksel ağrı olduğu, ancak bu durumun çoğunlukla hafif ve geçici nitelikte olduğu belirlenmiştir. Fonksiyonel kısıtlılık açısından değerlendirildiğinde, katılımcıların büyük kısmında konuşma ile ilgili belirgin bir problem gözlenmemiştir. Ancak, tat alma hissine bozukluğunda diğer

sorulara kıyasla daha yüksek skorlar elde edilmiş olup bu durum bazı bireylerde tedavi sonrası dönemde duyuşal deęişikliklerin ortaya çıkabildiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, uygulanan dental tedavilerin hastaların yaşam kalitesi üzerinde genel olarak olumsuz bir etki oluşturmadığını desteklemektedir.

**Anahtar Kelimeler:** OHIP-14, Ağız Sağlığına Bağlı Yaşam Kalitesi Deęerlendirmesi, Apikal Rezeksiyon, Endodontik Tedavi, Odontojenik Kist ve Tümörler